

# **GUÍA DE TRABAJO Nº4 – Matemática 7ºAB (Semana 4)**

<u>OA 2(Sexto básico)</u>: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas.

Profesor Responsable: Estefanía Serrano Zamorano

#### **RECUERDA:**

Cuando hablamos de jerarquía de operaciones hablamos del orden en el que se deben realizar las operaciones en las expresiones matemáticas donde tenemos más de una operación, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias..., es decir, en operaciones combinadas Dicho de otra forma, es la prioridad que tienen unas operaciones frente a otras a la hora de resolverlas, teniendo en cuenta su nivel dentro de la jerarquía

### Cómo se resuelven las operaciones combinadas

Cuando tenemos expresiones donde se combinan operaciones, debemos empezar resolviendo las operaciones por el primer nivel, teniendo en cuenta las siguiente premisas:

No podemos mezclar operaciones de distinto nivel

El objetivo es reducir los niveles hasta llegar al más simple, que es donde sólo hay sumas y restas Los paréntesis deben resolverse como si se trataran de expresiones individuales, por lo que debe aplicarse la jerarquía de operaciones independientemente del resto de la expresión.

### Jerarquía de operaciones. Prioridad de operaciones matemáticas

Éste es el orden en el que deben realizarse las diferentes operaciones que pueden existir en una expresión matemática:

Paréntesis, corchetes o llaves (se resuelven de dentro hacia afuera)

Potencias y raíces

Multiplicaciones o divisiones

Sumas o restas

Además recuerda siempre ir resolviendo las operaciones de izquierda a derecha.

Observa el video para visualizar los ejemplos.



# 1.- Calcula el resultado en cada caso:

a) 3 154 + (45 243 -2 142 · 16)	b) [35 000 + ( 400 000 : 25) + 2 000 000]
3 154 + (45 243 – 34 272)	[35 000 + 16 000 + 2 000 000]
3 154 + 10 071	[ 51 000 + 2 000 000]
13.225	2 051 000
Primero resuelvo el paréntesis y dentro del	Se resuelven los paréntesis de adentro hacia
paréntesis la multiplicación, luego la resta. Y	fuera, por lo que se resuelve la división del
cuando ya no hay paréntesis la suma.	paréntesis interno y luego las sumas del
	paréntesis mayor.
c) 2 500 000 – (370 000 : 37) ·100	d)100 000 ·[145 000 : 100 + 145]
2 500 000 - 10 000 · 100	100 000 ·[ 1 450 + 145]
2 500 000 - 1 000 000	100 000 · 1595
1 500 000	159 500 000
Primero se resuelve el paréntesis, para luego	Se resuelve el paréntesis y dentro de este
realizar la multiplicación y por último la resta.	paréntesis se resuelve la división y luego la
	suma. Cuando ya no hay paréntesis se realiza la
	multiplicación
e) 656 038 – (354 500 : 5) + 36 119	f) {34 · 25 + [100 + 5 ( 350 · 0)] -100}
656 038 - 70 900 + 36 119	{34 · 25 + [100 + 5 · 0 ] - 100}
585 138 + 36 119	${34 \cdot 25 + [100 + 0] - 100}$
621 257	${34 \cdot 25 + 100 - 100}$
	{ 850 + 100 – 100}
Se resuelve la división del paréntesis y después	{ 950 – 100}
realizamos la resta y luego la suma.	850
	Se resuelven los paréntesis de adentro hacia
	afuera, y con ellos priorizando las
	multiplicaciones antes de la suma.

# 2.- Remarca del mismo color aquellas expresiones en las que obtengas el mismo resultado.

 18 • 64 000 + 4 500
 8 • 585 000 - 450 000 • (3 + 5)
 175 000 • 10 + 160 000 • 4

 540 000 • 2 + 60 000
 350 000 • 5 + 320 000 • 2
 115 561 • 10 + 890

El cuadro 1 es igual al cuadro 6 (18 · 64 000 + 4 500 = 115 561 · 10 + 890)

El cuadro 3 es igual al cuadro 5 (175 000  $\cdot$  10 + 160 000  $\cdot$  4 = 350 000  $\cdot$  5 + 320 000  $\cdot$  2)



- 3.- Identifique las operaciones necesarias para resolver los siguientes problemas:
- a) Macarena recién ha empezado a trabajar y desea saber la cantidad de dinero que va destinada a las cotizaciones en su AFP para su jubilación. Ella tiene un sueldo de \$600000, y la décima parte de esa cantidad es para esas cotizaciones

100nn

10000

10000 10000

Para saber la décima parte de las cotizaciones debo: Debemos: Dividir por 10, El número 600 000.

10000 b) Una empresa fabrica 100 pares de zapatos de distintos modelos diariamente. Se trabaja de lunes a viernes. Si vende cada par de zapatos en promedio a \$15 000, ¿qué operación hay que hacer para saber la cantidad de dinero que recibe la empresa por concepto de venta en un año?

Para saber la cantidad de dinero que recibe la empresa por concepto de venta debo: Multiplicar 15 000 por 100 y luego ese resultado multiplicarlo por los días trabajados que son 240 en un año.

- 4.- Resuelve los siguientes problemas que involucran las cuatro operaciones
- a.- Una cancha para el "futbolito" tiene la medida de 48m · 24m. Carlos quiere dibujar a escala un modelo de la cancha y elige en su cuaderno de matemáticas la longitud de 30 cuadros para el largo de la cancha. ¿Con cuántos cuadros Carlos debe dibujar el ancho en su modelo? Calcula utilizando razones.

La razón entre el ancho y el largo es 24: 48 = 1: 2 → El ancho en el dibujo de ser la mitad de 30 cuadritos.

30:2 = 15

Carlos debe dibujar el ancho de la cancha con 15 cuadritos.

b.- Tres estudiantes universitarios formaron un grupo para jugar lotería y decidieron repartir una eventual ganancia según la cantidad de apuestas que hizo cada uno de ellos. Bernardo compró un cartón, Cristián dos cartones y Paula cuatro cartones. El grupo ganó \$ 14.000.000. ¿Cómo debieron repartir los \$ 14.000.000? Calcula con razones

La razón entre los números de los cartones es de 1:2:4

 $1+2+4=7 \rightarrow$  Se debe dividir la ganancia por 7

\$14.000.000:7 = \$2.000.000 Se reparte la ganancia en la razón 1:2:4

Bernardo: 1 · \$ 2.000.000

Cristián: 2 · \$ 2.000.000 = **\$ 4.000.000**  $4 \cdot \$ 2.000.000 = \$ 8.000.000$ Paula:



c.- El curso 6ª de 30 alumnos planificó un paseo al zoológico. El profesor jefe recibió cotizaciones de dos empresas para el viaje en bus.

Primera cotización: \$ 5.000 por alumno.

Segunda cotización: \$ 135.000 en total para el curso.

Una semana antes del paseo se decidió tomar la segunda cotización. En el día del paseo faltaban 5 alumnos. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno de los alumnos que participaron en el paseo de curso? Compara las cotizaciones

Precio por alumno de la primera cotización \$5.000

Número de alumnos en el paseo: 30 - 25 = 25

Se debe dividir el monto total de la 2º cotización por 25.

\$135.000 : 25 = \$ 5.400

Cada uno de los alumnos debe pagar \$ 5.400

Realmente se pagó \$ 400 más en comparación con la 1º cotización.

\$135.000 : 30 = \$ 4.500

Con 30 alumnos participantes cada uno de ellos hubiera pagado solamente \$ 4.500

Debido a la ausencia de 5 alumnos el monto por alumno subió por \$ 900

- d.- En un almacén se venden todos los artículos con la oferta: *Lleve 3 y Pague 2*. El precio normal de un paquete de servilletas era de \$ 600.
- a) ¿Cuánto se debe pagar por los 3 paquetes de servilletas?
- b) ¿Cuál es el precio rebajado de un paquete de servilletas?
- c) Con la misma oferta se junta 3 unidades de jabón en una bandeja y se la vende por \$ 900. Calcula el precio normal de 3 unidades



